

BLACKJAK®

DISTRIBUÉ PAR:



Extraits humiques.

Capacité

Composition	Acides fulviques (4,50% p/p) Acides humiques (20,50% p/p) Extrait humique total (25,00% p/p)
Formulation	(SC) - Suspension Concentrée
N° Homologation	CHPPUA 15 55 211
Distributeur	Devagri

CARACTÉRISTIQUES

BLACKJAK est une léonardite liquide innovante (SC), 100% naturelle, issue de matières organiques extrêmement décomposées (acides humiques, fulviques, ulmiques, humine et nutriments naturels), et s'assimilant rapidement avec la caractéristique exceptionnelle de présenter un pH acide.

Cultures	Mode d'emploi	Dose
CULTURES MARAICHÈRES (tomates, aubergines, poivrons, haricots, melons, pastèques, concombres, courgettes, choux, laitues, etc.)	Applications périodiques pendant tout le cycle. Il favorise les effets des engrais et correcteurs.	Fertirrigation: Après la transplantation: 5-10 l/ha Pendant tout le cycle végétatif: 4-6 l/ha par application
FRAISES, FRAMBOISES, AIRELLES	6 applications périodiques et espacées de 2 semaines, pendant le cycle végétatif.	Fertirrigation: 2-3 l/ha
AGRUMES, ARBRES FRUITIERS, RAISIN DE TABLE, VIGNE, OLIVIERS, BANANIER, etc.	Au début du cycle végétatif.	Plant: 25 ml de BLACKJAK dans 10 l d'eau par arbre
	Entre 3 et 4 applications pendant la saison de culture, en profitant les applications des engrais et des correcteurs (chélateurs).	Fertirrigation: 2-4 l/ha et application
POMMES DE TERRE, OIGNONS, CAROTTES, POIREAUX, CÉLERI, etc.	Après la préparation du sol et/ou l'ensemencement postérieur.	Sol: En lignes 2 à 4 l/ha
	1ère application : à 20-25 cm de hauteur. 2ème application : répéter la même dose 15-20 jours plus tard.	Foliaire: 1-2 l/ha et application
MAÏS, COTON, CÉRÉALES, TABAC, TOURNESOL, etc.	Après la préparation du sol et/ou l'ensemencement postérieur.	Sol: En lignes 2-4 l/ha
	Réaliser 5-6 applications par saison.	Irrigation au goutte à goutte, employer à des doses de 2,5 l/ha
	1ère application : à 20-25 cm de hauteur. 2ème application : répéter la même dose 15-20 jours plus tard.	Foliaire : 1-2 l/ha
BETTERAVE	Après la préparation du sol et/ou l'ensemencement postérieur.	Sol: En lignes 2-4 l/ha
	1ère application : à 10-12 semaines après l'ensemencement. 2ème application : répéter la même dose 2 semaines plus tard.	1ère application : à 10-12 semaines après l'ensemencement 2ème application : répéter la même dose 2 semaines plus tard

Autres Applications	Mode d'emploi	Dose
APPLICATION FOLIAIRE	Remplir le réservoir d'application à moitié. Ajouter premièrement BLACKJAK à la dose recommandée et puis les engrais foliaires et/ou phytosanitaires. Agiter et appliquer.	50 ml/100 l d'eau
TRAITEMENT DES GRAINES	24 heures avant la plantation tremper/ submerger les graines dans une solution de BLACKJAK à la dose recommandée pour promouvoir plus rapidement en cas d'urgence.	Graines de céréales: 500 ml de BLACKJAK pour 100 l d'eau
		Graines de coton, pommes de terre, carottes, oignons: 250 ml/100 l d'eau
COMBINÉ AVEC DES CORRECTEURS	Il favorise l'absorption des macro et micro éléments.	50 ml/arbre (20 ml pour les jeunes plants) avec les correcteurs de Fe